

Durchführung öffentlich empfohlener Schutzimpfungen gemäß STIKO-Empfehlungen für Asylbewerber in EAE M-V

Stand: 15.09.2016

Abteilung Gesundheit

Seite 1 von 1

Ansprechpartner:
Dr. M. LittmannTelefonnummer:
0381-4955-312E-Mail Adresse:
Martina.littmann@lagus.mv-regierung.de

Ankunftsalter	Empfohlene Impfung gegen <i>(zunächst Beginn der Impfungen vor Ort; ggf. Weiterführung der erforderlichen Grundimmunisierungen lt. STIKO-Empfehlungen in den zuständigen Kommunen)</i>
0 – voll. 3. (4.) Lebensjahr	<p>Ab Beginn 3. Lebensmonat - Kleinkindalter</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Infanrix Hexa[®]) / (Hexyon[®]): Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis (IPV), Haemophilus influenzae b (Hib) Hepatitis B (HB) (6fach-Impfstoff) <p>Ab Beginn 10. Lebensmonat: Masern-Mumps-Röteln (MMR-Impfstoff) + Varizellen</p>
Ab Beginn 4. (5.) Lebensjahr - 17 Jahre	<p>Je nach Verfügbarkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tetanus-Diphtherie-Pertussis-Poliomyelitis (Tdap-IPV) Repevax[®]: ab Beginn 4. Lebensjahr Boostrix Polio[®]: ab Beginn 5. Lebensjahr • Tetanus-Diphtherie-Pertussis (Tdap) Boostrix[®]: ab Beginn 5. Lebensjahr • Tetanus-Diphtherie-Poliomyelitis (Td-IPV) Revaxis[®]: ab Beginn 6. Lebensjahr <p>Masern-Mumps-Röteln (MMR) + ggf. Varizellen</p>
Erwachsene ab 18 Jahre	<p>Alle Erwachsene:</p> <p>Je nach Verfügbarkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tetanus-Diphtherie-Pertussis-Poliomyelitis (Tdap-IPV) Repevax[®] Boostrix Polio[®]: • Tetanus-Diphtherie-Pertussis (Tdap) Boostrix[®] • Tetanus-Diphtherie-Poliomyelitis (Td-IPV) Revaxis[®] <p>Zusätzlich für nach 1970 Geborene: Masern-Mumps-Röteln (MMR)</p>

Zusätzliche Indikationsimpfung INFLUENZA mit Vaxigrip[®] für:

- Schwangere ab 20. Schwangerschaftswoche
- Personen ab 60 Jahre
- Kinder (ab 6 Monate), Jugendliche und Erwachsene mit chronischen Krankheiten