

Die Impfungen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen.
Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll.
Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den STIKO-Empfehlungen
für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), 2024
Quelle: Robert Koch-Institut
www.rki.de

Gemeinsam
Verantwortung übernehmen



www.mv-impft.de



Mecklenburg-Vorpommern
Ministerium für Soziales,
Gesundheit und Sport



Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V

Alter	in Wochen	in Monaten									in Jahren									
		6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	ab 18	ab 60	
			U4			U5	U6				U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1		J2			
Impfung																				
Rotaviren		G1 ^o		G2	(G3)															
Tetanus ^b		G1	N	G2	N	G3 ^d	N				A1	N	A2	N	A ^f					
Diphtherie ^b		G1	N	G2	N	G3 ^d	N				A1	N	A2	N	A ^f					
Keuchhusten ^b Pertussis		G1	N	G2	N	G3 ^d	N				A1	N	A2	N	A3 ^f	N				
Hib ^b H. influenzae Typ b		G1	N	G2	N	G3 ^d	N													
Kinderlähmung ^b Poliomyelitis		G1	N	G2	N	G3 ^d	N						A1	N						
Hepatitis B ^b		G1	N	G2	N	G3 ^d	N													
Pneumokokken ^b		G1	N	G2	N	G3 ^d	N										S ⁱ			
Meningokokken B ^c		G1	N	G2	N		G3 ^d	N												
Meningokokken C							G1	N												
Masern						G1	N		G2	N						S ^g				
Mumps / Röteln						G1	N		G2	N										
Windpocken ^b Varizellen						G1	N		G2	N										
HPV ^b Humane Papillomviren														G1 ^e	G2 ^e	N				
Gürtelrose ^b Herpes zoster																	G1 ⁱ	G2 ⁱ		
Grippe ^b Influenza																	S ^k (jährlich)			
COVID 19																	G1 ^h G2 ^h G3 ^h	S ^k (jährlich)		

ERLÄUTERUNGEN

G	GRUNDIMMUNISIERUNG (in bis zu 3 Teilimpfungen G1 – G3)
S	STANDARDIMPFUNG
A	AUFRISCHIMPFUNG
N	NACHHOLIMPFUNG (Grundimmunisierung bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)
U	Früherkennungsuntersuchung
J	Jugenduntersuchung (J1 im Alter von 12 – 14 Jahren)

- ^a Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen

^b Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen; Säuglinge (inkl. Frühgeborene) werden mit PCV13 oder PCV15 geimpft

^c Gemäß Fachinformation besteht die Impfserie im Alter von 2 – 23 Monaten aus 3 Impfstoffdosen, ab dem Alter von 24 Monaten aus 2 Impfstoffdosen

^d Mindestabstand zur vorangegangenen Impfstoffdosis: 6 Monate

^e Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahre oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Impfstoffdosis ist eine 3. Impfstoffdosis erforderlich

^f Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung 1-malig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung
- ^g Eine Impfstoffdosis eines MMR-Impfstoffs für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit

^h Impfung bis die Anzahl der für die Basisimmunität erforderlichen ≥ 3 SARS-CoV-2-Antigenkontakte (davon mindestens 1 Impfung) erreicht ist. Mindestimpfabstand zwischen G1 und G2 ≥ 4 bis vorzugsweise 12 Wochen, und zwischen G2 und G3 ≥ 6 Monate

ⁱ Impfung mit PCV20

^j Zwei Impfstoffdosen des adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoffs im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten

^k Jährliche Impfung im Herbst

* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden.