

ARE - Wochenbericht MV

Stand: 12.03.2025

Aktuelles zu Akuten Respiratorischen Erkrankungen

Saison 2024/25

Kalenderwoche 10

03.03. – 09.03.2025

Die Beobachtung und Bewertung der Ausbreitung Akuter Respiratorischer Erkrankungen (ARE, umgangssprachlich: Erkältungskrankheiten) ist ein wichtiger Bestandteil des Infektionsschutzes. Zu diesem Zweck werden in Mecklenburg-Vorpommern (MV) in der Erkältungszeit (Oktober bis Mitte April) anonymisierte Daten von 66 Arztpraxen (Sentinelpraxen) aus den Berufsgruppen der Kinderärzte und Hausärzte (in diesem Bericht: Allgemeinmediziner und hausärztlich tätige Internisten sowie HNO-Ärzte) durch das LAGuS analysiert. Von der 40. Kalenderwoche (KW) eines Jahres bis zur 15. KW des Folgejahres werden die Daten wöchentlich dargestellt. Hinzu kommen die Meldungen aus knapp 70 Kindertageseinrichtungen über die Anzahl der Kinder, die an ARE erkrankt sind.

Zusammenfassende Bewertung der epidemiologischen Lage


In der 10. KW 2025 ist die Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen (ARE) in MV im Vergleich zur Vorwoche relativ konstant geblieben. Die ARE-Quote (Anteil der ARE-Patienten an allen Personen, die einen Kinder- oder Hausarzt aufgesucht haben) lag bei 15,3 %. Hochgerechnet auf die Bevölkerung in MV entspricht das einem Wert von 3.241 Arztbesuchen wegen ARE pro 100.000 Einwohner (Konsultationsinzidenz).

Der stärkste Rückgang der ARE-Aktivität zeigte sich in der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen, während die Aktivität bei den 5- bis 14-Jährigen anstieg.

Von den teilnehmenden Kindertageseinrichtungen wurde gemeldet, dass ca. 10,6 % der betreuten Kinder wegen einer ARE nicht in der Einrichtung waren.


Die ARE-Aktivität ist auf die Ko-Zirkulation verschiedener Atemwegserreger zurückzuführen, darunter aktuell hauptsächlich Influenza Viren (A+B) (37 %), aber auch RSV (8,7 %) und Rhinoviren (7,7 %). Nur diese werden in der folgenden Grafik im Saisonverlauf dargestellt.

Rechnerische Gesamtzahl ARE-Patienten in MV und die aktuell am häufigsten vorkommenden Erreger



Aktuelle Meldewoche

ARE-Konsultationsinzidenz: akute respiratorische Erkrankungen
pro 100.000 Einwohner in MV in der 10. KW



Überblick Meldedaten

Gesamt	Kinderärzte	Hausärzte
52	9	43

Meldende Ärzte (syndromisch):

Anzahl Patienten, gesamt:

14.980	2.348	12.632
--------	-------	--------

Anzahl ARE-Patienten:

2.288	1.015	1.273
-------	-------	-------

Anteil ARE von Patienten, gesamt:


15,3 %	43,2 %	10,1 %
--------	--------	--------

Syndromische Surveillance - Ärzte

ARE-Konsultationsinzidenz

Die ARE-Konsultationsinzidenz (gesamt) ist in der 10. KW 2025 im Vergleich zur Vorwoche stabil geblieben. Die hochgerechnete ARE-Konsultationsinzidenz lag in der 10. KW 2025 bei 3.241 Arztkonsultationen wegen einer neu aufgetretenen ARE pro 100.000 Einwohner in MV. Das entspricht rechnerisch einer Gesamtzahl von 52.804 Arztbesuchen wegen akuter Atemwegserkrankungen. Die Zahl der Arztbesuche wegen ARE lag in der 10. KW 2025 über dem Niveau des Mittelwertes der Vorsaisons im gleichen Zeitraum.

Arztkonsultationen aufgrund von ARE pro 100.000 Einwohner je Saison




Konsultationsinzidenz in verschiedenen Altersgruppen

In der 10. KW 2025 war die höchste Konsultationsinzidenz in der Altersgruppe der 0- bis 4-Jährigen zu verzeichnen. Diese lag rechnerisch bei 16.235 je 100.000 Personen dieser Altersgruppe.

Im Vergleich zur Vorwoche bewegten sich die Konsultationsinzidenzen aller Altersgruppen in relativ üblichen Schwankungsbereichen.

Arztkonsultationen aufgrund von ARE je Altersgruppe pro 100.000 Einwohner der Altersgruppe



* Kalenderwoche mit der höchsten Inzidenz bei den 0-4-Jährigen

Virologische Surveillance

In der 10. KW 2025 wurden 414 Sentinelproben von 76 Ärzten eingesandt. Es wurden in insgesamt 243 Proben (58,7 %) respiratorische Viren identifiziert. Es fanden sich 88 Proben (21,3 %) mit Influenza B-Viren, 65 Proben (15,7 %) mit Influenza A-Viren, 36 Proben (8,7 %) mit Respiratorischen Synzytialviren (RSV), 32 Proben (7,7 %) mit Rhinoviren, 25 Proben (6 %) mit Metapneumoviren, 14 Proben (3,4 %) mit Adenoviren, 3 Proben (0,7 %) mit SARS-CoV-2 und 1 Probe (0,2 %) mit Parainfluenzaviren (PIV).


Influenza Viren (A+B) waren die am häufigsten nachgewiesenen Erreger, gefolgt von RSV und Rhinoviren. Zusammen machen diese Erreger einen Anteil von 53,4 % aus.

Anzahl nachgewiesener ARE-Erreger und Anteil an den eingesandten Proben (Positivenquote)

		6. KW	7. KW	8. KW	9. KW	10. KW	Saison ab 40. KW
Anzahl eingesandter Proben*		312	294	437	484	414	7.721
Anzahl Proben mit Virusnachweis		152	137	230	270	243	3.182
	Anteil Positiver, gesamt	48,7 %	46,6 %	52,6 %	55,8 %	58,7 %	41,2 %
Influenza A-Viren	Anzahl positiver Befunde	66	47	85	120	65	776
	Anteil Positiver	21,2 %	16,0 %	19,5 %	24,8 %	15,7 %	10,1 %
Influenza B-Viren	Anzahl positiver Befunde	21	32	53	86	88	351
	Anteil Positiver	6,7 %	10,9 %	12,1 %	17,8 %	21,3 %	4,5 %
SARS-CoV-2	Anzahl positiver Befunde	5	4	9	2	3	664
	Anteil Positiver	1,6 %	1,4 %	2,1 %	0,4 %	0,7 %	8,6 %
RSV	Anzahl positiver Befunde	10	14	30	20	36	173
	Anteil Positiver	3,2 %	4,8 %	6,9 %	4,1 %	8,7 %	2,2 %
Adenoviren	Anzahl positiver Befunde	6	5	10	10	14	168
	Anteil Positiver	1,9 %	1,7 %	2,3 %	2,1 %	3,4 %	2,2 %
Metapneumoviren	Anzahl positiver Befunde	19	16	34	22	25	203
	Anteil Positiver	6,1 %	5,4 %	7,8 %	4,5 %	6,0 %	2,6 %
Parainfluenzaviren	Anzahl positiver Befunde	4	2	1	3	1	149
	Anteil Positiver	1,3 %	0,7 %	0,2 %	0,6 %	0,2 %	1,9 %
Rhinoviren	Anzahl positiver Befunde	31	22	32	20	32	860
	Anteil Positiver	9,9 %	7,5 %	7,3 %	4,1 %	7,7 %	11,1 %


*Die Anzahl der Proben mit Virusnachweis entspricht nicht der Summe der positiven Proben, da es zu Mehrfachinfektionen (z. B. mit Influenza- und Rhinoviren) und somit zu mehreren Nachweisen je Probe kommen kann. Anteil Positiver = [Anzahl Erregernachweise / Anzahl eingesandter Proben] (in Prozent).

Anzahl der untersuchten Proben und nachgewiesene Erreger




Verteilung der Erreger in verschiedenen Altersgruppen


Anzahl der nachgewiesenen Viren in den eingesandten Proben differenziert nach Altersgruppen der Patienten



Anzahl nachgewiesener Erreger je Altersgruppe in den eingesandten Proben



Rechnerische Gesamtzahl aller ARE-Patienten* in MV nach detektierten Erregern je Altersgruppe



* Mehrfachinfektionen möglich.

Syndromische Surveillance - Kindertageseinrichtungen


Für die syndromische Surveillance in Kindertageseinrichtungen werden alle Kinder gemeldet, die in den teilnehmenden Einrichtungen in der Berichtswoche aufgrund von Erkältungssymptomen (z. B. Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber) als erkrankt gemeldet waren. Dies beinhaltet alle Atemwegserkrankungen unabhängig vom Erreger. Insgesamt nehmen in dieser Saison 69 Kindertageseinrichtungen an der Surveillance teil. Davon haben sich 61 in der 10. KW 2025 beteiligt.

Die ARE-Rate lag in der 10. KW 2025 bei 10,6 % und damit höher als die durchschnittliche Rate des gleichen Zeitraums der Vorjahre (6,5 %). Die höchste ARE-Rate in der aktuellen KW wurde aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald (13,9 %) gemeldet.

Gemeldete ARE bei Kindern in den teilnehmenden Kindertageseinrichtungen

		6. KW	7. KW	8. KW	9. KW	10. KW	Saison ab 40. KW
MV, gesamt	Kinder in den Einrichtungen	5.208	4.850	5.330	4.957	4.973	103.483
	davon mit ARE erkrankt	487	465	405	469	529	7.231
	Anteil ARE-erkrankter Kinder	9,4 %	9,6 %	7,6 %	9,5 %	10,6 %	7,0 %
HRO	Kinder in den Einrichtungen	81	150	150	150	150	3.005
	davon mit ARE erkrankt	4	18	13	13	9	246
	Anteil ARE-erkrankter Kinder	4,9 %	12,0 %	8,7 %	8,7 %	6,0 %	8,2 %
SN	Kinder in den Einrichtungen	234	234	54	234	234	3.834
	davon mit ARE erkrankt	33	29	9	12	13	261
	Anteil ARE-erkrankter Kinder	14,1 %	12,4 %	16,7 %	5,1 %	5,6 %	6,8 %
MSE	Kinder in den Einrichtungen	1.555	1.566	1.711	1.650	1.650	30.183
	davon mit ARE erkrankt	129	153	152	161	210	2.268
	Anteil ARE-erkrankter Kinder	8,3 %	9,8 %	8,9 %	9,8 %	12,7 %	7,5 %
LRO	Kinder in den Einrichtungen	650	683	735	569	659	13.911
	davon mit ARE erkrankt	55	50	61	63	77	1.045
	Anteil ARE-erkrankter Kinder	8,5 %	7,3 %	8,3 %	11,1 %	11,7 %	7,5 %
VR	Kinder in den Einrichtungen	579	579	617	476	579	11.641
	davon mit ARE erkrankt	32	28	33	27	36	622
	Anteil ARE-erkrankter Kinder	5,5 %	4,8 %	5,3 %	5,7 %	6,2 %	5,3 %
NWM	Kinder in den Einrichtungen	442	442	442	442	442	9.001
	davon mit ARE erkrankt	56	42	30	29	43	565
	Anteil ARE-erkrankter Kinder	12,7 %	9,5 %	6,8 %	6,6 %	9,7 %	6,3 %
VG	Kinder in den Einrichtungen	1.189	718	1.143	958	808	22.798
	davon mit ARE erkrankt	122	91	84	109	112	1.559
	Anteil ARE-erkrankter Kinder	10,3 %	12,7 %	7,3 %	11,4 %	13,9 %	6,8 %
LUP	Kinder in den Einrichtungen	478	478	478	478	451	9.110
	davon mit ARE erkrankt	56	54	23	55	29	665
	Anteil ARE-erkrankter Kinder	11,7 %	11,3 %	4,8 %	11,5 %	6,4 %	7,3 %

Rate der an ARE erkrankten Kinder in Kindertageseinrichtungen je Saison



Erläuterungen

ARE

ARE ist die Abkürzung für „Akute Respiratorische Erkrankungen“. Es handelt sich vereinfacht gesagt um Atemwegserkrankungen, wie z. B. Erkältungen, Grippe oder Corona.

ARE-Quote/ARE-Rate

Beschreibt den prozentualen Anteil von ARE-Patienten an den Gesamtpraxiskontakten. Im Zeitverlauf spricht man von einer Rate, der einzelne Wert wird als Quote bezeichnet.

ARE-Konsultationsinzidenz

Ist die Anzahl der Arztbesuche aufgrund von ARE pro 100.000 Einwohner. Hierbei wird ermittelt, wie viele ARE-Patienten durchschnittlich in den teilnehmenden Arztpraxen vorstellig waren. Dieser Mittelwert wird anschließend auf alle Arztpraxen in MV hochgerechnet, um die Gesamtzahl der ARE-Konsultationen in MV abzuschätzen. Um die Verbreitung von ARE in der Bevölkerung mit anderen Gebieten (z. B. Landkreisen oder Bundesländern) vergleichbar zu machen, wird die Gesamtzahl von ARE-Patienten auf 100.000 Einwohner bezogen, wodurch eine sogenannte Inzidenz entsteht. Bei der Konsultationsinzidenz handelt es sich somit um eine Hochrechnung. In diesem Bericht nicht erfasst sind Personen, die an einer ARE erkrankten, jedoch keinen Arzt aufgesucht haben.

Um Schätzfehler zu minimieren, wird auf eine möglichst repräsentative Stichprobe an meldenden Sentinel-Arztpraxen geachtet. Außerdem erfolgt die Berechnung getrennt für die Berufsgruppen der Kinderärzte und der Hausärzte (in diesem Bericht: Allgemeinmediziner und hausärztlich tätige Internisten sowie HNO-Ärzte), um facharztspezifische Unterschiede im Konsultationsverhalten weitestgehend auszugleichen.

Die Konsultationsinzidenz für das gesamte Bundesland wird anhand der Altersgruppe und unterschieden in die Berufsgruppen der Kinderärzte und Hausärzte getrennt errechnet und zu einem Gesamtwert zusammengezogen. Auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte sind hierzu nicht ausreichend Daten vorhanden, weshalb hier die Gesamtzahlen lediglich über die Meldungen der Berufsgruppen hochgerechnet werden. Die Summe der hochgerechneten ARE-Patienten in den Landkreisen und kreisfreien Städten kann daher leicht von der ermittelten Gesamtzahl für MV abweichen.

Für den Vergleich mit den Vorjahren dient der Mittelwert des gleichen Zeitraums über die letzten 5 zurückliegenden Jahre.

Sentinel

Sentinelserhebungen sind ein aktives, auf freiwilliger Mitarbeit der beteiligten Akteure aufbauendes Werkzeug der Surveillance. Epidemiologische Daten werden dabei als Nebenprodukt der gesundheitlichen Vorsorge erfasst, um die epidemiologische Entwicklung bestimmter Krankheitsfelder innerhalb eines Teils oder der gesamten Bevölkerung zu bestimmen. Die Daten für Sentinelproben, z. B. Abstriche, werden anonym und stichprobenartig aufgenommen.

Arztpraxen/Ärzte

In dem Bericht werden die Daten von 89 teilnehmenden Ärzten verarbeitet. Diese sind in 66 Arztpraxen, darunter 18 Gemeinschaftspraxen, tätig.

Surveillance

Surveillance ist eine Art der epidemiologischen Überwachung und bezeichnet die systematische kontinuierliche Überwachung von Erkrankungen.

Syndromische Surveillance

Bei der syndromischen Surveillance werden Daten zur Häufigkeit des Auftretens von ARE gesammelt und zur Analyse der Ausbreitung von ARE in der Gesellschaft verwendet.

Virologische Surveillance

Bei der virologischen Surveillance wird untersucht, welche Erreger zu den gemeldeten Erkrankungen geführt haben und wie groß deren Anteil an den ermittelten ARE-Erkrankungen ist.

Positivenrate

Berechnet sich aus der Anzahl von Erregernachweisen bzw. positiver Proben durch die Anzahl eingesandter Proben und wird in Prozent angegeben.

Kindertageseinrichtungen

Sind in diesem Bericht Einrichtungen zur Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren. Hierunter zählen Krippen, Kindergärten und Einrichtungen mit beiden Bereichen.

Datenstand

Im Vergleich zur Vorwoche können aufgrund von Nachmeldungen Abweichungen auftreten.

Verantwortlich

LAGuS

Abteilung Gesundheit

Dezernat Infektionsschutz/Prävention

<https://www.lagus.mv-regierung.de/Gesundheit/InfektionsschutzPraevention/>